



به نام خالق هستی بخش

دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

عنوان:

سرکلاژ (مکدونالد)

تهیه کننده: مرضیه عباسی (کارشناس مامایی)

منبع: کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ جلد اول

تاریخ تدوین: مهر ۱۳۹۹

تاریخ آخرین بازنگری: مهر ۱۴۰۱



«مرکز آموزشی درمانی حافظ»



نکات قابل توجه:

- ✓ انجام این عمل عارضه ای برای جنین ندارد.
- ✓ رژیم غذایی مانند یک بارداری طبیعی است.
- ✓ در صورت انجام زایمان طبیعی نخ سرکلاژ باید بعد از هفته ۳۷ برداشته شود. ممکن است ترشحات خونی روشن پس از عمل سرکلاژ تا چند روز وجود داشته باشد.
- ✓ انجام این عمل بعد از هفته ۲۳ حاملگی با احتمال زیاد عفونت و پارگی کیسه آب همراه است و توصیه نمی شود.



موارد ممنوعیت سرکلاژ:

- خونریزی واژن.
- انقباضات رحمی (شل و سفت شدن شکم).
- پارگی پرده های جنینی.
- باز شدن دهانه رحم .
- ناهنجاری جنین.

عوارض سرکلاژ:

- پارگی پرده های جنینی
- خونریزی و عفونت
- سقط و از دست دادن بارداری

توجه: در صورت وجود عفونت بالینی و یا قریب

الوقوع بودن سقط یا زایمان خارج سازی بخیه

ها باید انجام گیرد چون انقباضات رحمی ممکن

است منجر به پارگی رحم شود.



نارسایی دهانه رحم (سرویکس) چیست؟

هنگامی که دهانه رحم فرد باردار بدون هیچ گونه احساس درد و انقباض باز شود و موجب دفع جنین نارس و سقط می گردد، به آن نارسایی گردن رحم (سرویکس) می گویند.

سرکلاژ چیست؟

سرکلاژ (دوختن دهانه رحم) عملی جراحی است که جهت حفظ جنین و جلوگیری از سقط جنین جهت افرادی که به نارسایی گردن رحم (سرویکس) مبتلا هستند انجام می شود. باید توجه داشت که سرکلاژ یک روش درمانی قطعی نیست بلکه با سرکلاژ به بیمار کمک می شود که احتمال سقط و یا زایمان زودرس کمتر شود.



معمولا این عمل بعد از هفته ۱۲ حاملگی پس از بی حسی موضعی یا بیهوشی از طریق بخیه کردن دهانه رحم صورت می گیرد.

نکات لازم قبل از عمل سرکلاژ (دوختن

دهانه رحم)

- ❖ پیش از عمل سرکلاژ بررسی کامل سلامت جنین (غربالگری ۳ ماهه اول) صورت گیرد.
- ❖ عفونت های احتمالی دستگاه تناسلی درمان شود.
- ❖ عدم نزدیکی با همسر یک هفته قبل از عمل جراحی رعایت شود.
- ❖ با سونوگرافی سلامت جنین و میزان مایع آمنیوتیک بررسی شود.



نکات لازم بعد از عمل سرکلاژ

- ❖ استراحت تا ۱ روز پس از عمل و استراحت نسبی در ادامه بارداری (محدودیت فعالیت) توصیه می شود.
- ❖ نداشتن نزدیکی جنسی ترجیحا تا پایان بارداری.
- ❖ مصرف آنتی بیوتیک خوراکی
- ❖ شیاف پروژسترون در صورت صلاحدید پزشک

علائم هشدار دهنده پس از جراحی:

- شل و سفت شدن شکم.
- خونریزی واژینال.
- کمردرد یا درد در ناحیه زیر شکم.
- تب بالای ۳۸ درجه و لرز.
- خروج ناگهانی آب گرم از بدن (پاره شدن ناگهانی کیسه آب).
- تهوع و استفراغ.

