

هیستروسکوپی: درون بینی رحم از مسیر سرویکس (دهانه

رحم)

مشاهده مستقیم تمام قسمت های مفره رحم رابه وسیله

ابزار مخصوص و مجهز به پراخ پشمنی میسر می کند.

مناسب ترین زمان برای انجام این آزمایش 5 روز

بعد از اتمام فونریزی قاعدگی است که واژن و لب

های فرج تمیز شده است.

****** بیهوشی یا بی حسی نفاعی داده میشود .

از ابزاری به اسم هیستروسکوپ استفاده میشود که

از طریق کانال سرویکس حدود یک الی دو سانتی متر

داخل شده و تحت دید مستقیم به جلو هدایت

میشود.

روش هیستروسکوپی غالباً به عنوان یک روش

تکمیلی برای کورتاژ و لاپاراسکوپی در مورد نازایی

، فونریزی هایی با علت نامشخص، باقی وسقط های

مکرر در اوایل IUD ماندن حاملگی انجام

میشود و بعضی از بیماری ها (مثلا تومورهای فیبروید

کوچک داخل مفره رحم) را می توان عین انجام

هیستروسکوپی انجام داد .

اقدامات قبل از عمل همراهی:

1- شب قبل از عمل یک شام ساده و سبک

مصرف شود.

2- از 8 ساعت قبل از عمل npo باشد .

(یعنی چیزی از راه دهان مصرف نشود)

3- رو ز قبل عمل رضایت همسر داشته باشد.

4- موهای ناحیه عمل کوتاه شده و تمیز باشد.

اقدامات بعد از عمل همراهی:

1- در بیشتر اوقات یک ساعت بعد از عمل

سریکال (مایعات) برای بیمار

2- حدود 8 ساعت بعد از عمل در صورت بی

حسی نفاعی نباید سر تفت را بالا آورد و چیزی

زیر سر بیمار باشد.

3- حتما نوشیدنی کافئین دار از قبیل قهوه

و نسکافه مصرف شود.

4- در صورت فونریزی شدید گزارش شود.

5- کنترل علائم حیاتی شروع می شود.



به نام خالق هستی بخش

مرکز آموزشی درمانی حافظ

دانشگاه علوم پزشکی شیراز



عنوان: میستروسکوپی

تهیه کنندگان: خدیجه گورکانی (کارشناس پرستاری)

منبع: زنان و زایمان ویلیامز 2022

تاریخ تدوین: اردیبهشت 1403

تاریخ بازنگری:



مراقبت های بعد از عمل

- 1- طبق دستور داروها مصرف شود.
- 2- در صورت تب ولرز و فونریزی شدید مراجعه شود.
- 3- در صورت داشتن ترشحات بدبو از واژن مراجعه شود.
- 4- بعد از دو هفته با جواب پاتولوژی به پزشک مراجعه شود.
- 5- تا سه هفته نزدیکی نداشته باشید.
- 6- رفتن به حمام، روز بعد از عمل