

## ۲-اپیدورال:

حس پایین بدن را کاهش می دهد. شما هم چنان هوشیار و بیدار هستید و می توانید به راحتی از تخت خود پایین بیایید و راه بروید.

### نحوه انجام اپیدورال:

این روش در قسمت پایین کمر انجام می شود. شما معمولاً در حالت نشسته هستید. در حالت نشسته پوست شما ضد عفونی می شود. سپس متخصص بیهوشی پس از بی حسی موضعی محل مورد نظر سوزن مخصوص را در فضای اپیدورال که جلوی از فضای نخاع است قرار می دهد سپس لوله پلاستیکی نازکی به نام کاتتر در محل قرار داده و سوزن را خارج می نماید و شما مواد بی حسی را از طریق همین کاتتر دریافت می کند و باعث کاهش درد شما می شود.

اثر بی دردی چه زمانی ظاهر می شود؟

از آنجا که زمانی طول می کشد تا دارو وارد عصب ها شوند شروع بی دردی معمولاً 10-20 دقیقه بعد از تجویز دارو می باشد.

بعد از انجام بی حسی چه احساسی خواهیم داشت؟  
درد به میزان قابل توجهی کم خواهد شد ولی شما احساس فشار بر ناحیه نشیمنگاه و زیر مثانه به دلیل قرار گیری سرنوzaD متوجه خواهید شد این روش را به عنوان بهترین و استاندارد ترین روش می شناسند.

بی حسی اپیدورال چقدر طول می کشد؟  
تا هر زمان نیاز باشد ادامه می یابد پس از زایمان کاتتر برداشته می شود و بعد از چند ساعت حس شما به حالت عادی برمی گردد.

آیا بی حسی اپیدورال روی بچه اثر دارد؟  
تحقیقات فراوان نشان می دهد این روش برای مادر و نوزاد اکملاند بی خطر است.

## فوايد روشن اپیدورال:

► در طولانی ترین مرحله زایمان (باشدن دهانه رحم) شما می توانید استراحت کنید.

► به موقع می توان بدون درد به نوزاد فشار آورد و به روند زایمان بیشتر کمک کرد.

► انرژی لازم را دارا هستید.

► کاملاً بدون درد هستید و می توانید به راحتی حرکت کنید.

### خطرات این روش:

معمولًا شایع نیست و قابل درمان است.

1) کاهش فشارخون که با دریافت سرم و چرخیدن به پهلوی چپ و تجویز داروهای بالابرندۀ فشار خون درمان می شود.

(2) سردرد

(3) لرز که کمتر دیده می شود و حتی گاهی بدون این روش هم دیده شده است.

## 3- پمپ:PCA

يعني بيمار روی درد خود كنترل دارد. در اين روش ماده بى دردی آماده شده از قبل در دستگاه قرار می گيرد و توسط فرد متخصص مقدار آن تنظيم می گردد. بيمار هنگام احساس درد با فشردن دكمه اي که در اختيار او قرار می گيرد مقدار ماده بى حسي تنظيم شده را بدرون رگهای خود هدایت می کند و بدین صورت احساس درد از بين ميروند. اين پمپ به بيمار اين امكان را ميدهد که هر گاه نياز به داروي بيشتری برای کنترل درد خود داشت از آن استفاده نماید بدون نيار به پرسنار و تزریق مکرر آمپول.

این پمپ از طریق راه های وریدی-اپیدورال-زیرجلدی و منطقه ای قابل استفاده می باشد.

## مقدمه:

زایمان فرآیندی دردناک است و درد آن همواره به عنوان یکی از دردهای شدید در زندگی مثال زدنی است. راههای مختلفی برای کاهش درد زایمان وجود دارد ولی امروزه مردم برای رهایی از درد زایمان به سزارین روی می آورند. در حالی که سزارین برای کاهش درد زایمان ابداع نشده است بلکه هدف از ابداع این روش برای تولد نوزاد - حفظ جان نوزاد و مادر در مواقعی بوده است که زایمان طبیعی به هر دلیلی خطرناک تشخیص داده شده می شود. بنابراین هدف از سزارین جلوگیری از مرگ مادر و نوزاد است نه کاهش درد مادر. در کشورهای پیشرفته به جای سزارین از زایمان بدون درد استفاده می شود. در کشورهای ماهم در بعضی مراکز درمانی از جمله بیمارستان حافظ این روش ها به عنوان یک روش نوین مورد استفاده قرار می گیرند که در ادامه به توضیح این روش ها می پردازیم.

## ۱- انتونوکس با گاز و هوا:

### انتونوکس چیست؟

انتونوکس که غالباً گاز و هوا نامیده می شود یک مخلوط گازی است که از حداقل ۵۰٪ اکسیژن و ۵۰٪ اکسید نیتروژن تشکیل شده است. این گاز بی رنگ و بی بو است.

## چه زمانی باید آن را مصرف کنیم؟

شما میتوانید انتونوکس را در هر مرحله که مایل باشید استفاده نمایید. کافی است ماسک را روی صورت خود قرار داده و عمیق و منظم تنفس کنید بدین صورت انتونوکس همراه با تنفس شما رها شده و به ریه ها می رود و دی اکسید کربن از ریه ها خارج می شود. به تنفس عمیق ادامه دهید تا اینکه احساس سرگیجه خفیف به شما دست بدهد سپس دست شما شل شده و ماسک انتونوکس را رها می کنید در نتیجه انتونوکس دیگر به ریه ها وارد نمی شود. ظرف چند ثانیه شما مجدداً به حالت طبیعی باز می گردید.

### مزایای انتونوکس:

- ❖ استفاده از آن آسان است.
- ❖ تحت کنترل شماست.
- ❖ اثر آن به مدت طولانی در بدن شما باقی نمی ماند.
- ❖ می تواند درد و ناراحتی انقباض ها را کاهش دهد.
- ❖ اکسیژن دارد که برای کودک شما خوب است.

### معایب انتونوکس:

- ❖ یک مسکن متوسط است.
- ❖ ممکن است موجب شود احساس تهوع کنید.
- ❖ موجب خشکی دهان شما می شود.

## چند نکته مفید و مهم:

- ✓ به محض احساس شروع یک انقباض انتونوکس را مصرف کنید. حداقل ۲۰ ثانیه طول می کشد تا اینکه گاز به قدر کافی در جریان خون شما وارد شود که درد را تا حدی تخفیف دهد و ۴۰-۵۰ ثانیه طول می کشد تا حداکثر اثر خود را بگذارد. اگر آنقدر صبر کنید که انقباض واقعاً آزار دهنده شود و سپس انتونوکس را به ریه ها وارد کنید اثر آن در بین دو انقباض ظاهر خواهد شد که دیگر نقشی در کاهش درد شما نخواهد داشت.
- ✓ بین انقباض ها مقدار کافی آب مز مزه کنید تا دهان شما را مرطوب نگه دارد.
- ✓ هنگامی که در مرحله دوم زایمان نوزاد را به بیرون رحم هل می دهید خانم ها معمولاً احساس می کنند اگر بدون استفاده از انتونوکس برکار خود تمراز کنند راحت تر هستند. در صورتی که اگر در ابتدای انقباض مقدار کمی گاز مصرف کنند می توانند ماسک را کنار گذاشته به نوزاد فشار بیاورند.
- ✓ اگر انتونوکس نمی تواند بی دردی کافی را فراهم کند می توان از یک روش دیگر در کنار این روش استفاده کرد.