



به نام خالق هستی بخش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عنوان:

عفونت بعد از زایمان

تهیه کننده: فاطمه صادقی

منبع: راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان

ویرایش سوم - پرستاری تایلور ۲۰۱۵

تاریخ تدوین: مهر ۱۳۹۹

تاریخ بازنگری: مهر ۱۴۰۱

«مرکز آموزشی درمانی حافظ»



کلیه مطالب آموزشی در سایت بیمارستان

حافظ به آدرس

hafez.sums.ac.ir

موجود می باشد.

مراقبت‌های لازم جهت جلوگیری از عفونت:

❖ شستشوی محل بخیه ها با شامپو بچه و خشک

نگه داشتن محل

❖ مصرف به موقع آنتی بیوتیک ها

❖ استفاده از بانداژ شکمی

❖ مصرف مایعات و غذاهای نرم و کم حجم

❖ مراجعه به موقع به پزشک بعد از ترخیص از

بخش «هفت روز پس از زایمان»

❖ مراجعه به موقع و فوری به پزشک در صورت

وجود ترشحات خونابه ای و تب و لرز

دلایل بروز عفونت و باز شدن بخیه ها:

- رعایت نکردن بهداشت فردی و تمیز نگه نداشتن محل عمل
- عدم دریافت به موقع آنتی‌بیوتیک‌ها
- حمل اجسام سنگین که منجر به باز شدن بخیه ها می شود
- عدم استفاده موثر و منظم از بانداژ شکمی
- پارگی طولانی مدت کیسه آب
- مکنونیومی بودن مایع آمنیوتیک
- دیابت
- بیماریهای نقص سیستم ایمنی



◀ آغاز سوزش و خارش شدید

◀ باز شدن بخیه ها

◀ خونریزی شدید

◀ ترشحات بدبوی وازینال

◀ درد شکمی

◀ خونریزی طولانی



عفونت بعد از زایمان:

در بعضی مواقع بیماران بعد از سزارین، همراه با علائم غیر طبیعی در ناحیه عمل مراجعه می کنند.

علائم عفونت بعد از عمل سزارین و زایمان

طبیعی:

◀ ترشح چرکی و خونابه ای از محل عمل و یا

بخیه ها و یا باز شدن بخیه های بیمار همراه با

تب و لرز شدید

◀ تب و لرز

◀ ترشح چرکی از ناحیه عمل یا زایمان

◀ هماتوم شدید (جمع شدن خون در بخشی از

بدن خارج از رگهای خونی) در ناحیه عمل یا

زایمان

