



به نام خالق هستی بخش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عنوان:

پارگی کیسه آب

تهیه کننده: رویا حاج نصیری (کارشناس پرستاری)

منبع: کتاب ویلیامز 2022

تاریخ تدوین: مهر 1399

تاریخ آخرین بازنگری: تابستان 1401



«مرکز آموزشی درمانی حافظ»

اقداماتی که مادر باید در چنین مواردی

انجام دهد:

- در صورت بروز ترشحات چرکی و بودار، آبریزی، سوزش و خونریزی، درد پهلو سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
- آنتی بیوتیک تجویز شده را در زمان تعیین شده استفاده نمایید.
- در صورت حساس و دردناک بودن شکم و تب به پزشک مراجعه نمایید.
- رعایت بهداشت فردی
- چک حرکت جنین
- پیگیری سونو، نوار قلب جنین و آزمایشات که توسط پزشک تجویز می شود

اقداماتی که انجام می شود:

- تجویز دارو جهت رسیدگی ریه جنین
- دادن آنتی بیوتیک به مادر جهت جلوگیری از عفونت داخل رحمی
- بررسی تعیین بلوغ ریه جنین
- بستری مادر تا 34 هفتگی و ادامه یا ختم حاملگی بستگی به سن حاملگی و نظر پزشک و آزمایشات بیمار دارد
- چک علائم حیاتی مادر و بررسی مادر از نظر تب و افزایش ضربان قلب و درد رحمی
- ترشحات بد بو- عفونت خون

عوارض پارگی زودرس پرده ها

- زایمان زودرس
- افزایش احتمال عفونت
- جدا شدن جفت
- بروز مشکلات تنفسی در جنین

علائم خطر:

- افزایش ضربان قلب جنین
- افزایش ضربان قلب مادر
- تب و لرز
- حساس شدن رحم
- ترشحات بد بو و چرکی

خطر پارگی زودرس پرده ها در موارد

زیر بیشتر است:

- سابقه پارگی زودرس پرده ها در حاملگی قبلی
- شواهد شروع روند زایمان
- سیگار
- سابقه زایمان زودرس
- عفونت باکتریایی واژن
- خونریزی از واژن به ویژه در سه ماهه سوم

خروج مایع از واژن چه به صورت مداوم و چه به صورت یکباره قبل از شروع درد های زایمانی است.

تشخیص های پارگی زودرس پرده ها:

- ✓ مشاهده مستقیم نشت مایع از واژن
- ✓ انجام آزمایش بر روی مایع نشت شده
- ✓ سونوگرافی که کاهش آب دور جنین را نشان می دهد.

علت پارگی زودرس پرده ها (کیسه

آب):

- عفونت های دستگاه تناسلی
- التهاب حاد جفت