



به نام خالق هستی بخش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عنوان:

## کورتاژ

تهیه کننده: زهره نوروزی (کارشناس اتاق عمل)

منبع: کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ جلد ۱-

بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده- تالیف

فاطمه رفیعی

تاریخ تدوین: مهر ۱۳۹۹

تاریخ آخرین بازنگری: مهر ۱۴۰۱

«مرکز آموزشی درمانی حافظ»



## مراقبت های بعد از عمل

- ❖ به خونریزی بعد از کورتاژ توجه داشته باشید.
- ❖ قرص یا کپسول آهن تا ۳ ماه استفاده شود.
- ❖ آنتی بیوتیک را سر ساعت و طبق دستور پزشک مصرف نمایید.
- ❖ نمونه جدا شده از بافت را جهت پاتولوژی تحویل داده و جواب آن را از طریق مراجعه به پزشک متخصص پیگیری نمایید.



## چه مدت زمان طول می کشد تا بهبودی حاصل شود؟

مدت زمان عمل کورتاژ طولانی نیست و بسیار کوتاه است.

بیمار می تواند تا چند ساعت بعد از عمل به خانه برگردد. اگر بیهوشی عمومی انجام شده باشد گاهی تهوع و استفراغ و احساس خواب آلودگی و ضعف برای مدت کوتاهی بیمار را آزار می دهد.

دل پیچه های ضعیف و خلط خونی و یا کمی خونریزی از گلو از عوارض بیهوشی عمومی می باشد (اگر لوله گذاری برای بیهوشی انجام شده باشد)



## باز کردن دهانه رحم و کورتاژ (D&C) به

معنی تراشیدن یا برداشتن نمونه ای از بافت درونی رحم است.

## در چه مواردی نیاز به انجام کورتاژ می باشد؟

کورتاژ ممکن است برای کشف و شناسایی دلایل خونریزی غیر طبیعی انجام شود. این عمل همچنین وقتی که خانمی دچار سقط ناقص شده باشد نیز انجام می شود. در صورتی که مقداری از محصولات بارداری رحم، باقی مانده باشد با عمل کورتاژ و از طریق باز نمودن دهانه رحم خارج می شوند.



## انجام این عمل چه خطراتی برای بیمار خواهد

### داشت ؟

میزان بروز خطرات و عوارض این عمل بسیار کم است و شامل خونریزی، عفونت، پارگی دیواره رحم، روده ها و مثانه می باشد. در صورت پارگی رحم احتمال آسیب به اندام های مجاور وجود دارد و ممکن است جراحی اضافی لازم شود. بنابراین اگر بعد از کورتاژ نشانه هایی چون خونریزی شدید از واژن، تب، درد شکم و ترشحات بدبو داشتید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

### قابل توجه مددجوی عزیز:

- ✓ روز بعد از سقط می توانند به سرکار برگردند.
- ✓ از همه روشهای جلوگیری از بارداری، پس از کورتاژ می توان استفاده کرد که البته بستگی به شرایط عمومی بدن فرد و سایر بیماری های همراه دارد.
- ✓ ۲-۳ هفته بعد از کورتاژ توسط پزشک ویزیت شوید.



## مراقبت های بعد از عمل کورتاژ:

مقداری لکه بینی و خونریزی بعد از عمل قابل انتظار است که با گذشت زمان بهتر شده و معمولاً طی ۱ الی ۲ هفته متوقف می شود.

در صورت تب، درد، خونریزی طولانی یا زیاد (بیشتر از خونریزی دوران پریودی)، سرگیجه، ضعف، دفع بافت به پزشک مراجعه نمایید.

در موارد خیلی کم ممکن است بعد از عمل کورتاژ زخم یا چسپندگی ایجاد شود. به دلیل باز تر شدن دهانه رحم باکتری ها می توانند به راحتی وارد رحم شوند و این باعث عفونت می شود، بنابراین باید به مصرف آنتی بیوتیک بعد از کورتاژ توجه لازم شود.

