

## بهبودی:

انجام فعالیت برای بهبودی مناسب است. روز های اول پیاده روی مختصری در حد 10 تا 15 دقیقه داشته باشید و بعد از گذشت یک هفته می توانید به مدت 60 دقیقه آهسته پیاده روی کنید. تا چهار تا شش هفته از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید.

اگر احساس درد می کنید می توانید از مسکن طبق دستور پرشک استفاده نمایید.

## عوارض:

- درد زیر شکم تا چند روز بعد از عمل؛
- درد در شانه ها؛
- مقدار اندکی خونریزی واژینال تا 48 ساعت؛
- احساس خستگی بیش از حد طبیعی تا چند روز.



## به نام خالق هستی بخش

### دانشگاه علوم پزشکی شیراز

#### عنوان: کیست تخدمان

تهیه کننده: فاطمه قائد محمدی / کارشناس پرستاری

منبع: بیماری های زنان و زایمان بکمن و لینگ 2019

تاریخ تدوین: مرداد 1400

تاریخ آخرین بازنگری: -



«مرکز آموزشی درمانی حافظ»



در صورت بروز علائم زیر سریعاً به پزشک مراجعه نمایید:

افزایش درد شکم؛

حرارت بالای بدن با از دست دادن اشتها و حالت تهوع؛

زخم اطراف بخیه قرمز و دردناک باشد؛

سوژش و درد در زمان ادراری، پرادراری یا عدم توانایی ادرار؛

احساس درد و تورم و قرمزی در پaha.

### نکات مربوط به بعد از عمل:

توصیه های غذایی که پزشک می گوید را رعایت کنید؛  
معمولاً بعد از عمل نیاز به بستری نیست و مرخص می شود.  
یک فرد را همراه خود داشته باشید تا شما را به خانه ببرد؛  
پرستار شما را معاینه می کند که آیا می توانید خودتان ادرار تان  
را دفع کنید؛

قبل از رفتن به خانه به شما توصیه های دارویی و غذایی می  
شود. که باید آن ها را رعایت کنید و احتمالاً مسکن به شما بدنهند  
و همچنین نوبت مراجعه بعدی را به شما بدهند؛

تأثیر بیهوشی عمومی در افراد گوناگون متفاوت می باشد. بعد از  
آنکه به هوش آمدید ممکن است احساس گیجی کنید و نتوانید  
به درستی فکر کنید. این علائم بعد از 24 ساعت از بین می روند.  
؛

ممکن از جراح برای شما از بخیه قابل جذب استفاده کرده باشد.  
اما اگر از نوع دیگری از بخیه استفاده کند باید 7 تا 10 روز بعد  
بخیه توسط پزشک کشیده شود.

### جراحی لپاراسکوپی:

این روش برای کیست های ساده و کوچک استفاده می شود. در طی  
لپاراسکوپی جراح چند برش کوچک به طول های یک تا پنج سانتی  
متر روی بدن فرد ایجاد می کند. یکی از این برش ها نزدیک به شکم  
می باشد و دو تا دیگر پایین تر هستند. ابزار کوچکی و یک دوربین  
کوچک که به آن لپاراسکوپی می گویند را از راه این برش ها وارد  
بدن فرد می کند. جراح تخدمان و کیست شما را از این طریق بررسی  
می کند . سپس کیست ها را از بدن خارج می نماید. بعد خارج  
کردن کیست بریدگی ها را با بخیه یا چسب می بندند.

### جراحی باز (لپاراتومی):

در بعضی مواقع مانند زمانی که کیست تخدمان بزرگ باشد و یا  
سرطانی باشد به جراحی کیست تخدمان باز نیاز می باشد. در این  
روش برش ها نسبت به لپاراسکوپی بزرگتر هستند و در پایین  
شکم برش زده می شود تا به تخدمان برسد. در بعضی از شرایط  
تنها خارج کردن کیست کافی نیست و باید کل تخدمان را خارج  
کنند. گاهی اوقات ممکن از جراح در حین عمل لپاراسکوپی  
جريان عمل خود را تغییر دهد و عمل لپاراتومی انجام دهد.



کیست تخدمان یک توده می باشد که از مایع پر شده است. و  
ممکن است داخل یا روی تخدمان به وجود بیاید. این کیست  
ها معمولاً خطری ندارند اما اگر باعث درد و ناراحتی بشوند  
امکان بروز سلطان وجود دارد و باید عمل جراحی انجام شود.

### انواع جراحی کیست تخدمان:

جراحی کیست رحم ممکن است با روش لپاراسکوپی انجام  
شود که با ایجاد سوراخ عمل را انجام می دهنند و یا اینکه به  
برش بزرگ تری جهت جراحی نیاز باشد. پزشک با توجه به نوع  
اختلالی که به وجود آمده و نوع کیستی که می خواهد بردارد  
یکی از این دو روش را انتخاب می کند.